



COMMENT TRAITER LE REGARD TOMBANT

FICHE CONSEIL
OTELINA
N°13

Le regard est le moyen de communication le plus intense après la parole.

Il permet d'exprimer sa joie ou sa peine.

Les yeux sont ce que l'on voit en premier dans le visage.

Les attentes exprimées sur le regard sont souvent très fréquentes et variées :

Queue du sourcil abaissée :

- La queue du sourcil peut tomber parce qu'il y a une tempe creuse et donc une absence de soutien juste sur la zone voisine.
- Une arcade sourcilière peu proéminente est aussi responsable de l'aspect tombant de la queue du sourcil.
- Cela peut être dû aussi à une paupière supérieure lourde.
- L'impression peut être également donnée par une épilation à la pince mal structurée.

NOS SOLUTIONS :

Pour une queue du sourcil abaissée

- Injection de toxine botulinique
- Injection d'acide hyaluronique soit dans la tempe soit dans le sourcil
- Lifting chirurgical de la queue du sourcil (ou lifting temporal)
- Radiofréquence couplée aux ultrasons
- Maquillage permanent (Otelina Swiss Spa)

*Reveals your
beauty!*



Paupière supérieure tombante :

- Le relâchement cutané va dans cette zone se visualiser par un excès de peau plus ou moins prononcé. La forme de l'arcade sourcilière est très importante dans le processus du relâchement cutané. En effet une arcade plus proéminente va retarder le relâchement de la paupière supérieure.

NOS SOLUTIONS :

Pour une paupière supérieure tombante

- Injection de toxine botulinique (en début de relâchement)
- Injection d'acide hyaluronique dans le sourcil
- Radiofréquence couplée aux ultrasons
- Blépharoplastie supérieure (acte chirurgical ambulatoire)